

BIENVENUE AU TRAITEMENT DE L'ASTHME PAR SYMBICORT®



Bonjour,

Lisez ce qui suit pour obtenir des renseignements sur l'asthme et sur le traitement par Symbicort® que vous a prescrit votre médecin. Prenez toujours Symbicort® exactement comme votre médecin vous l'a indiqué.

Les voies respiratoires des personnes asthmatiques présentent de l'**inflammation**. L'inflammation peut s'aggraver et provoquer l'apparition de symptômes de l'asthme, moment où vos voies respiratoires commencent à rétrécir et à rendre la respiration difficile.

VOIES RESPIRATOIRES NORMALES

Aucune inflammation



VOIES RESPIRATOIRES ENFLAMMÉES

Contraction musculaire
Inflammation



SYMBICORT® CONTIENT UN MÉLANGE DE DEUX SUBSTANCES

FORMOTÉROL

Traite les symptômes.

- Peut aider à ouvrir vos voies respiratoires ou à les garder ouvertes
- Peut aider à rendre votre respiration plus aisée



BUDÉSONIDE

Traite l'inflammation.

- Peut aider à garder vos voies respiratoires ouvertes
- Réduit et prévient l'inflammation causée par l'asthme

Information sur l'innocuité

Symbicort® est utilisé pour traiter l'asthme chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

Les effets secondaires signalés le plus souvent avec Symbicort® sont les maux de tête, les tremblements, la sensation de cœur qui bat, la toux, l'irritation de la bouche et/ou de la gorge et l'enrouement. Si l'un de ces effets secondaires vous préoccupe, n'arrêtez pas le traitement, mais parlez-en à votre médecin.


Les médicaments suivants peuvent interagir avec Symbicort® : bêta-bloquants (propranolol, aténolol, timolol), kétoconazole, itraconazole, ritonavir, diurétiques (ou « pilules favorisant l'élimination de l'eau »), antidépresseurs et inhibiteurs de la monoamine oxydase.

Lorsque les BALA sont utilisés seuls sans un CSI, ils augmentent le risque d'hospitalisations et de décès liés à l'asthme. Symbicort® Turbuhaler® contient à la fois un CSI et un BALA. Les études révèlent que lorsqu'on utilise un CSI et un BALA ensemble, il n'y a pas de risque accru significatif d'hospitalisations et de décès liés à l'asthme.

Si vous avez pris des corticostéroïdes par voie orale pour traiter votre asthme et que vous éprouvez soudainement une crise d'asthme grave en commençant à prendre Symbicort®, consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des signes avant-coureurs d'aggravation de votre état, vous devez avertir immédiatement votre médecin ou vous rendre à l'hôpital le plus proche.

SYMBICORT®, TURBUHALER® et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc. © AstraZeneca Canada Inc. 2020

 Visionnez la vidéo éducative sur Symbicort® Turbuhaler® sur le site Symbicort.ca



Symbicort®
budésonide/fumarate
de formotérol dihydrate

1 : ASTHME LÉGER PERSISTANT

OU

2 : ASTHME MODÉRÉ OU GRAVE

TRAITEMENT DE **SECOURS**
ANTI-INFLAMMATOIRE AVEC
SYMBICORT® 200 TURBUHALER®

1

INHALATION EN
RÉPONSE AUX
SYMPTÔMES

+ 1

INHALATION APRÈS
QUELQUES MINUTES,
SI LES SYMPTÔMES
PERSISTENT

! Il ne faut pas prendre plus de 6 inhalations à la fois. Dans tous les cas, il ne faut pas prendre plus de 8 inhalations par jour.

TRAITEMENT DE **SECOURS** ANTI-INFLAMMATOIRE ET
D'ENTRETIEN AVEC SYMBICORT® _____ TURBUHALER®

1

INHALATION EN
RÉPONSE AUX
SYMPTÔMES

INHALATION(S)
LE MATIN

+ 1

INHALATION APRÈS
QUELQUES MINUTES,
SI LES SYMPTÔMES
PERSISTENT

INHALATION(S)
LE SOIR

! Il ne faut pas prendre plus de 6 inhalations à la fois. Dans tous les cas, il ne faut pas prendre plus de 8 inhalations par jour.

Votre médecin ne vous prescrira qu'**UNE SEULE** des deux approches affichées à gauche. Suivez ces directives et ayez toujours Symbicort® Turbuhaler® à portée de la main pour le soulagement rapide des symptômes.

PASSEZ À L'ACTION : Vous devez informer votre médecin si :



L'asthme n'est pas soulagé aussi bien ou aussi longtemps qu'à l'habitude

Vous n'êtes plus soulagé « comme à l'habitude » si vous notez une intensification de :

- la respiration sifflante
- la toux
- l'oppression dans la poitrine ou de l'essoufflement



Vous prenez plus de 8 inhalations par jour



Vous augmentez constamment l'usage de votre traitement de secours pendant 2 semaines sans obtenir une meilleure maîtrise de l'asthme



Vos symptômes vous réveillent la nuit



La valeur indiquée sur votre débitmètre de pointe représente 60 à 80 % de votre meilleur résultat personnel

Il pourrait s'agir de signes que votre asthme **S'AGGRAVE**. Consultez votre médecin pour évaluer votre dose et la maîtrise de votre asthme.

CHERCHEZ IMMÉDIATEMENT DE L'AIDE MÉDICALE si vous remarquez les signes avant-coureurs suivants :



Après avoir pris votre traitement de secours avec Symbicort® :

- vous ne ressentez aucun soulagement, ou
- vos symptômes d'essoufflement ou de respiration sifflante s'aggravent soudainement



Votre pouls est très rapide (plus de 120 battements par minute)



La valeur indiquée sur votre débitmètre de pointe représente moins de 60 % de votre meilleur résultat personnel

Parlez-en à un médecin **SANS TARDER** ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche.



Vous êtes essoufflé au repos